

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME: TEEJEL® GEL
(AND DOSAGE FORM): (GEL)

COMPOSITION:

Each 1 g contains :

Choline salicylate	87,1 mg
Alcohol	38,2 % m/m
Sugar free	

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION:

A 34. Local analgesics

PHARMACOLOGICAL ACTION:

Since the mouth is well endowed with pain nerve endings, lesions of the oral mucosa are apt to cause a pain level out of all proportion to their size. Even a small ulcer, which elsewhere would be considered trivial, causes the sufferer great discomfort, particularly if under pressure from a denture. The disturbance caused by a baby's teething is also well known. The prime need in treatment is for effective and rapid relief of pain by topical rather than systemic treatment. TEEJEL GEL supplies the answer to this need, and introduces a new approach to the treatment of pain and discomfort of the mouth, whatever its cause. The active ingredient choline salicylate is a highly soluble and non-irritant salt of salicylic acid with powerful analgesic and anti-inflammatory properties. Unlike aspirin, it can be applied directly to mucous membranes without causing irritation.

INDICATIONS:

Aphthous ulcers and other oral ulcerations and abrasions, denture sores, gingivitis, glossitis, thrush, herpes labialis, cheilosis, lesions of nasal mucosa (including the nasal and oral lesions of erythema multiforme and lichen planus), and infant teething.

CONTRAINDICATIONS:

Salicylate sensitivity.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Instructions to open tube:

1. Remove cap and invert.
2. Place cap over neck of tube.
3. Press firmly until seal is broken.

Using a well washed finger or finger-stall, apply an adequate amount of the gel (usually about one centimetre expressed from the tube for adults and older children and half a centimetre for infants up to 2 years) to the tender area of buccal or nasal mucosa. Massage in well and repeat the application three or four times daily before meals and also at bedtime.

SIDE EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

None observed. The slight tingling experienced is a direct effect of the alcohol content of the gel.

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT:

As for aspirin. Gastric lavage with symptomatic and supportive treatment.

IDENTIFICATION:

TEEJEL GEL is a clear colourless to slightly yellowish, thick gel flavoured with aniseed and menthol. The name TEEJEL GEL is printed on the tube.

PRESENTATION:

Preprinted sealed, aluminium tube closed with a screw cap containing 10 g of gel.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store at or below 25 °C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

REFERENCE NUMBER:

G2805 (Act 101/1965)

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE APPLICANT:

Mundipharma (Pty) Ltd,
PO Box 23162
Claremont
7735
South Africa
www.mundipharma.co.za

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT:

02 October 1979

Export details:

Namibia: NS0
Registration No. 14/13.1/0419
Botswana: S3
Reference No. B9311315

SKEDULERINGSSTATUS: **S0**

**EIENDOMSNAAM:
(EN DOSEERVORM)** **TEEJEL® GEL
(JEL)**

SAMESTELLING:

Elke 1 g bevat :
Choliensalisilaat 87,1 mg
Alkohol 38,2 % m/m
Suikervry

FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE:

A 34. Plaaslike analgetika

FARMAKOLOGIESE WERKING:

Omdat die mond goed bedeel is met senuwee-eindes, veroorsaak letsels aan die mondslymvliese 'n pyn wat buite alle verhouding is tot die grootte van die letsel. Sels 'n klein seertjie, wat op 'n ander plek onopgemerk sou bly, veroorsaak groot ongerief aan die lyer, veral as dit deur 'n kunsgebit gedruk word. Die probleme wat 'n baba met tandekry ondervind, is ook welbekend. Die behandeling daarvan moet veral toegespits word op spoedige en doeltreffende verligting van pyn deur plaaslike aanwending in plaas van sistemiese behandeling. **TEEJEL GEL** voorsien in hierdie behoefte deur 'n nuwe benadering tot die behandeling van pyn en ongerief in die mond, ongeag die oorsaak. Die aktiewe bestanddeel choliensalisilaat is 'n hoogs oplosbare en nie-irriterende sout van salisielsuur met 'n kragtige pynstillende en ontstekingswerende werking. Anders as aspirien, kan dit regstreeks aan die slymvliese gebruik word sonder dat dit irritasie veroorsaak.

INDIKASIES:

Afteuse mondulkusse en ander mondulkusse en ander mondsware en skaafplekke, kunsgebitseertjies, tandvleisontsteking, tongontsteking, sproei, herpes labialis, roulip, letsels aan die neusslymvliese (insluitende die neus- en mondletsels van veelvuldige eriteem en lichen planus) en die tandekry van 'n baba.

KONTRA-INDIKASIES:

Gevoeligheid vir salisilaat.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS:

Aanwysings om buis oop te maak:

1. Verwyder dop en keer om.
2. Plaas dop oor nek van buis.
3. Druk hard totdat seël breek.

Gebruik 'n gewaste vinger of vingerkap en plaas genoeg van die jel (vir volwassenes en ouer kinders word een sentimeter uitgedruk uit die buis, gewoonlik gebruik en vir babas en kinders tot twee jaar, 'n half sentimeter) op die gevoelige deel van die wang of neusslymvlies. Vryf goed in en herhaal die aanwending drie of vier keer per dag voor maaltye en met slaaptyd.

**NEWE-EFFEKTE EN SPESIALE
VOORSORGMATREËLS:**

Geen ongunstige reaksie is opgemerk nie. Die effense prikkelende gevoel kan regstreeks aan die alkoholinhoud van die jel toegeskryf word.

**BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING
EN BESONDERHEDE VAN DIE BEHANDELING
DAARVAN:**

Soos vir aspirien. Maagspoeling met simptomatiese en ondersteunende behandeling.

IDENTIFIKASIE:

TEEJEL GEL is 'n helder, kleurlose tot effens gelerige dik jel wat gegeur is met anys en mentol. Die naam **TEEJEL GEL** is op die buis gedruk.

AANBIEDING:

Verdrukte verseëlde aluminium buis toegemaak met 'n skroef dop, wat 10 g jel bevat.

BERGINGS- AANWYSINGS:

Bêre by of benede 25 °C.
HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

VERWYSINGSNOMMER:

G2805 (Wet 101/1965)

**NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE
APPLIKANT:**

Mundipharma (Edms) Bpk
Posbus 23162
Claremont
7735
Suid Afrika
www.mundipharma.co.za

**DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE
VOUBILJET:**

2 Oktober 1979

Uitvoer besonderhede:

Namibië: **NS0**
Registrasienuommer. 14/13.1/0419
Botswana: **S3**
Verwysingsnommer. B9311315